

## Anästhesieleistung bei Augeneingriffen – Verrechnung in TARMED

Ärztliche Leistung	Verrechnung (TARMED-Kapitel)
<p>1. Topische Tropfanästhesie Auge (= Lokalanästhesie/LA) durch Operateur oder Hilfsperson in seiner Delegation.</p> <p>Keine Leistung durch Anästhesiemediziniker während Eingriff.</p>	<p>Operateur: LA etc. (Kap. 00 resp. 08)</p> <p>Anästhesie: Keine Verrechnung</p>
<p>2. Topische Tropfanästhesie Auge (durch Operateur, Hilfsperson, Anästhesiemediziniker oder -pflegefachperson) mit <b>Monitored Anaesthesia Care</b> (mit oder ohne leichte Analgosedation) während Eingriff.</p> <p>Der Anästhesiemediziniker ist verantwortlich und präsent gemäss Definition in Tarmed. Seine Leistung ist auf den medizinischen Dokumenten (Prämedikation, Anästhesieprotokoll, Verordnung) eindeutig ersichtlich.</p>	<p>Anästhesie: nach <b>MAC</b> für operative Pos. durch Anästhesiemediziniker (Kap. 28)</p> <p><i>Anmerkungen:</i>  a) Die Tropfanästhesie kann, auch wenn durch Anästhesiemediziniker oder -pflegefachperson durchgeführt, <u>nicht</u> separat verrechnet werden.  b) Die Tropfanästhesie, auch wenn durch Anästhesiemediziniker oder -pflegefachperson durchgeführt, berechtigt <u>nicht</u> zur Verrechnung nach RK.</p>
<p>3. Topische Tropfanästhesie Auge mit <b>Allgemeinanästhesie</b> während Eingriff.</p> <p>Die Allgemeinanästhesie und der verantwortliche Anästhesiemediziniker sind auf den medizinischen Dokumenten (Prämedikation, Anästhesieprotokoll, Verordnung) eindeutig ersichtlich.</p>	<p>Anästhesie: nach <b>RK</b> für operative Pos. (Kap. 28)</p> <p><i>Anmerkung:</i>  Die Tropfanästhesie kann, auch wenn durch Anästhesiemediziniker oder -pflegefachperson durchgeführt, <u>nicht zusätzlich</u> verrechnet werden.</p>
<p>4. Retro-/Peribulbärblock (= Regionalanästhesie/RA) durch Operateur mit <b>MAC</b> (mit oder ohne <u>leichte</u> Analgosedation) für Blockade und anschliessend während Eingriff.</p> <p>Der Anästhesiemediziniker ist verantwortlich und präsent gemäss Definition in Tarmed. Seine Leistung ist auf den medizinischen Dokumenten (Prämedikation, Anästhesieprotokoll, Verordnung) eindeutig ersichtlich.</p>	<p>Operateur: Retro-/Peribulbärblock (Kap. 08)</p> <p>Anästhesie: nach <b>MAC</b> für operative Pos. (Kap. 28)</p>
<p>5. Retro-/Peribulbärblock durch Operateur in <b>kurzer Allgemeinanästhesie</b> (= in <u>tiefer*</u> Analgosedation) für Blockade und <b>MAC</b> anschliessend während Eingriff.</p> <p>* Analgosedation mit Massnahmen zur Sicherung einer suffizienten (Be-)Atmung = Allgemeinanästhesie.</p> <p>Die tiefe Analgosedation, der anschliessende MAC und der Anästhesiemediziniker sind auf medizinischen Dokumenten (Prämedikation, Anästhesieprotokoll, Verordnung) eindeutig ersichtlich.</p>	<p>Anästhesie: nach <b>RK</b> für operative Position (Kap. 28)</p>
<p>6. Retro-/Peribulbärblock durch Anästhesiemediziniker und <b>MAC</b> während Eingriff.</p>	<p>Anästhesie: nach <b>RK</b> für operative Position (Kap. 28)</p>

**MAC** = Monitored Anaesthesia Care - **RK** = Risikoklasse